

# DEVEDRYL LORATADINA

Comprimidos orales - Solución oral  
Venta Libre

Industria Argentina

K-140/F

#### FORMULAS:

Cada comprimido oral contiene:

LORATADINA .....10mg

Celulosa microcristalina, lactosa, almidón glicolato sódico, estearato de magnesio

Cada ml de jarabe contiene:

LORATADINA .....1 mg

Ácido cítrico monohidrato, propilenglicol, benzoato de sodio, glicerina, azúcar granular, sabor artificial durazno, agua para inyectable c.s.

#### ACCION TERAPEUTICA:

Antialérgico (Antihistamínico).

**USO DEL MEDICAMENTO: Lea detenidamente esta información:**

Está indicado para el alivio temporario de los síntomas causados por alergias respiratorias, como ser: secreción nasal, estornudos, lagrimeo y picazón en ojos, nariz y/o garganta.

Alergia de la piel previo diagnóstico médico.

**Como usar este medicamento:**

**Comprimidos:**

Adultos y mayores de 12 años: 1 comprimido (10 mg de Loratadina) por día: no más de 1 comprimido en 24 horas.

**Jarabe:**

Niños mayores de 6 años y con un peso menor a 30 kg: 5 ml de jarabe (5 mg de Loratadina) cada 24 horas.

Niños mayores de 6 años y con un peso mayor a 30 kg: 10 ml de jarabe (10 mg de Loratadina) cada 24 horas.

Para la administración a niños menores de 6 años, consultar al médico.

La duración del tratamiento no debe superar los 5 días ininterrumpidos.

#### CONTRAINDICACIONES:

- Hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes de la fórmula.

- Embarazo. Lactancia.

- Niños menores de 2 años de edad.

- Pacientes con enfermedad hepática y/o renal.

- Crisis asmática.

#### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Consulte a su médico antes de iniciar el tratamiento con este medicamento si es que usted tiene alguna enfermedad hepática y/o renal.

- No consuma alcohol mientras ingiere este producto porque puede potenciar los efectos adversos.

- En caso de alergia grave con dificultad respiratoria o hinchazón de cara y/o manos consultar inmediatamente con el médico.

- Suspender el tratamiento 48 horas antes de realizar cualquier tipo de prueba cutánea, ya que los antialérgicos pueden interferir eventualmente dando resultados "falsos positivos".

- Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

#### INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS:

Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de consumir este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos.

#### REACCIONES ADVERSAS:

Puede producir cansancio, sedación, somnolencia, dolor de cabeza, mareos, taquicardia, fatiga, palpitación, alergias cutáneas (rash) y náuseas.

En pacientes pediátricos se ha observado nerviosismo.

#### SOBREDOSIS:

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología: Hospital de

Niños Ricardo Gutiérrez. (011) 4962-6666/2247

Hospital Posadas (011) 4654-6648 / 4658-7777

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555

#### PRESENTACIONES:

**Comprimidos:** Envases conteniendo 10, 30 y 1000 comprimidos por 10 mg, siendo esta última de uso hospitalario exclusivo.

**Jarabe:** 1 y 100 frascos de 60 ml, 90 ml y 120 ml, siendo la presentación de 100 frascos de uso hospitalario exclusivo.

#### CONSERVACIÓN:

Conservar en lugar seco, a temperatura entre 8 °C y 25 °C, al abrigo de la luz.

**ESTE MEDICAMENTO COMO CUALQUIER OTRO, DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO**

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 49.410

Director Técnico: Leonardo Iannello  
Farmacéutico

Fecha de última revisión: 12/2009

Centro de información al consumidor: 4251-5955



Planta: Lamadrid 802 - Quilmes - Provincia de Bs. As., Argentina. C.P. (B1878CVZ)  
Tel. Fax: (54) (11) 4251-5954/5955