

LUAR-G COMPOSITUM

DIPIRONA + HIOSCINA

Inyectable - Comprimidos recubiertos - Gotas - Supositorios

Venta bajo receta

Industria Argentina

K-29/G

Cada comprimido recubierto contiene:

N-Butilbromuro de hioscina 10 mg.
Dipirona sódica 250 mg.
Excipientes autorizados c.s

Cada 100 ml. de gotas contiene:

N-Butilbromuro de hioscina 0,667 g.
Dipirona sódica 33,340 g.
Alcohol etílico 9.6% p/v
Excipientes autorizados c.s

Cada ampolla contiene:

N-Butilbromuro de hioscina 0,020 g.
Dipirona sódica 2,50 g.
Excipientes autorizados c.s.p 5 ml.

Cada supositorio para adulto contiene:

N-Butilbromuro de hioscina 0,010 g.
Dipirona sódica 1,00 g.
Excipientes autorizados c.s

ACCION TERAPEUTICA:

Espasmolítico - Analgésico

INDICACIONES:

Cólicos hepáticos, cólicos renales, todos los estados espasmódicos intensamente dolorosos de los órganos digestivos, vías biliares y urinarias. Estados espasmódicos de los órganos genitales femeninos, dismenorrea post - operatoria.

POSOLOGIA:

Comprimidos recubiertos: 1 ó 2, 3 veces al día. Deben ser ingeridos enteros.

Gotas: Adultos; 2 ml 3-4 veces al día. Niños en edad escolar: 1 ml 3-4 veces al día

Niños pequeños de más de 1 año: 0.5 ml 3 veces al día.

Ampollas: En estado espasmódico intenso, una ampolla intramuscular profunda o intravenosa lenta (5 min.). Nunca subcutánea ni intraarterial.

Supositorios: 1 supositorio, en caso necesario puede repetirse esta dosis varias veces al día, con intervalos de 2 a 4 horas.

CONTRAINDICACIONES PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Dipirona + Hioscina está contraindicada en casos de hipersensibilidad a la dipirona u otros derivados de pirazononas. No deben utilizarse tampoco en pacientes con alteraciones hematológicas y/o que presenten evidencias de depresión medular.

En raras ocasiones puede producir reacciones de hipersensibilidad. La reacción más seria es la reducción o desaparición de glóbulos blancos, por lo tanto se presenta un deterioro inesperado de la condición del paciente. Si aparece o reaparece fiebre y/o dolor de garganta de origen desconocido, suspender inmediatamente el medicamento y consultar al médico.

De: Impre Quil srl
Para: Control de Calidad
Asunto: Muestra para corrección
Fecha: 09/03/2010

Shock alérgico es otra reacción grave y rara, sus primeros síntomas son: prurito, sudoración fría, mareos, náuseas, dificultad para respirar; si ellos se presentan acudir al médico. Hasta que el mismo llegue, asegurarse de que el paciente permanezca acostado, con las piernas levantadas y las vías aéreas despejadas.

Usar con precaución especial durante el embarazo y la lactancia, en lactantes, niños. Insuficiencia renal o hepática y en pacientes con historia de úlcera péptica o enfermedades sanguíneas. Como todos los analgésicos antiinflamatorios inyectables, dipirona + hioscina debe usarse por esa vía el tiempo mínimo indispensable que determine el médico, y retornar lo mas pronto posible a la forma oral.

Es recomendable y seguro administrar a la forma inyectable en lugares provistos e idóneos para tratar prontamente el shock alérgico grave.

No usar la vía parenteral en glucoma de ángulo estrecho, íleo, retención urinaria, megacolon y taquiarritmias.

GOTAS:

Advertencias:

No debe administrarse en pacientes bajo tratamiento con Disulfiram

Precauciones:

Basado en la presencia de alcohol etílico como excipiente se deberán tener precauciones en cuanto a personas con enfermedad hepática, alcoholismo, epilepsia, embarazadas y niños.

EFFECTOS SECUNDARIOS:

Puede presentar constipación.

CONSERVACIÓN:

Conservar en lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN:

Comprimidos recubiertos: Envases con 10, 20, 50, 500 y 1000 comprimidos recubiertos, siendo las dos últimas para uso hospitalario exclusivo.

Ampollas: Envases con 1,6 y 100 ampollas, siendo el último para uso hospitalario exclusivo.

Gotas: Envases hospitalarios con 32 frascos de 20 ml.

Supositorios: Envases con 6 supositorios.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación.
Cert. Nº 42.898

"ESTE MEDICAMENTO DEBE SER USADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MÉDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN NUEVA RECETA MÉDICA"

Director Técnico: Leonardo Iannello
Farmacéutico

Fecha de última revisión: 07/2001



Planta: Lamadrid 802 - Quilmes - Provincia de Bs. As., Argentina. C.P. (B1878CZV)
Tel. Fax: (54) (11) 4251-5954/5955