

IBUPROFENO KLONAL

IBUPROFENO 400 mg

Comprimidos orales

Venta Libre

Industria Argentina

K-254/B

Cada comprimido oral contiene:

Ibuprofeno400mg.

Excipientes: Almidón pregelatinizado, celulosa microcristalina PH 101, croscarmelosa sódica, dióxido de silicio coloidal, lauril sulfato de sodio, talco, estearil fumarato de sodio, c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Antiinflamatorio, analgésico, antifebril.

USO DEL MEDICAMENTO: LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN:

Está indicado para el alivio sintomático de dolores (de espalda, de cabeza, menstruales, musculares, dientes), dolores producidos por artritis, dolores asociados a estados gripales y para reducir la fiebre.

CÓMO USAR ESTE MEDICAMENTO:

Adultos y mayores de 15 años: 1 comprimido cada 6 u 8 horas mientras los síntomas persistan. Dosis máxima: 1200 mg/día (3 comprimidos de 400 mg). Tomar el medicamento preferentemente después de las comidas.

Mayores de 65 años: consulte a su médico.

Niños menores de 15 años: consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES:

Alergia al ibuprofeno, aspirina u otros analgésicos-antiinflamatorios. Insuficiencia hepática y renal.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- No usar este medicamento por más de 5 días para el dolor o más de 3 días para la fiebre.

- Si los síntomas continúan o si el área dolorida está roja o hinchada, deberá consultar al médico.

- Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Aunque el Ibuprofeno tiene las mismas acciones que la aspirina y el paracetamol, no deben administrarse juntos excepto bajo supervisión médica.

- La ingesta del Ibuprofeno puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente.

- Consulte con su médico antes de tomar Ibuprofeno si sufre de úlcera gástrica o duodenal, enfermedades del hígado o riñón, hipertensión arterial y/o insuficiencia cardíaca.

Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

Si usted padece alguna enfermedad cardíaca o presenta factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemia (colesterol y triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo, etc. Deberá ingerir la dosis indicada por no más de 5 días para el dolor o 3 días por la fiebre.

REACCIONES ADVERSAS:

Este medicamento puede producir náuseas, acidez, trombocitopenia (disminución en el número de plaquetas), reacciones de hipersensibilidad (erupción, picazón, urticaria), dolor estomacal, trastornos en el tránsito intestinal, mareos y cefaleas.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS:

Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de consumir este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos.

SOBREDOSIS:

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

HOSPITAL DE PEDIATRÍA DR. RICARDO GUTIERREZ Tel.: (011) 4962-6666/2247

HOSPITAL DR. ALEJANDRO POSADAS Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777

CENTRO DE ASISTENCIA TOXICOLÓGICA LA PLATA Tel.: (0221) 451-5555

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES Tel.: 0800-333-0160

PRESENTACIONES:

Envases conteniendo 10, 20, 50, 60 y 1000 comprimidos por 400 mg, siendo este último de uso hospitalario exclusivo.

CONSERVACIÓN:

Conservar en lugar seco, a temperatura entre 15 °C y 30 °C, en su envase original, al abrigo de la luz.

ESTE MEDICAMENTO COMO CUALQUIER OTRO DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 41.042

Director Técnico: Leonardo Iannello
Farmacéutico

Fecha de última revisión: 03/2009



Planta: Lamadrid 802 - Quilmes - Provincia de Bs. As., Argentina. C.P. (B1878CV)
Tel. Fax: (54) (11) 4251-5954/5955