

# ISODILAN ISOXSUPRINA

Comprimidos - Inyectable

Venta bajo receta

Industria Argentina

K-24/E

**PRESENTACIONES FARMACEUTICAS:**

**Fórmula cuali y cuantitativa:**

**Comprimidos:**

Cada comprimido contiene:

Isoxsuprina Clorhidrato .....10mg; 20 mg

Excipientes autorizados c.s.

**Inyectable:**

Isoxsuprina Clorhidrato .....10mg

Agua Bidestilada c.s.p..... 2 ml

**ACCION TERAPEUTICA:**

Vasodilatador de acción periférica por acción directa sobre la musculatura lisa.

**INDICACIONES:**

Amenaza de aborto, insuficiencia cardíaca congestiva; hemorragias arteriales recientes; tirotoxicosis.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**

Vigilar en mujeres embarazadas ya que por atravesar la barrera placentaria puede provocar taquicardia en el recién nacido; en ancianos puede producir hipotermia.

**INTERACCION CON OTRAS DROGAS:**

El consumo excesivo de tabaco (nicotina) puede interferir con la acción de la isoxsuprina debido a que la nicotina produce el efecto inverso a la droga.

**INTERFERENCIAS DIAGNOSTICAS:**

Durante la infusión intravenosa puede producir incremento de los valores normales de glucosa en sangre, grasas libres en suero e insulina, y disminución de la concentración sérica de potasio.

**EFFECTOS INDESEABLES:**

Taquicardia; hipotensión; puede producir edema de pulmón cuando se administra en forma intravenosa durante el trabajo de parto en prematuros.

**POSOLOGIA:**

Se administrará de acuerdo a prescripción médica. La dosis aconsejada de 10 a 20 mg. tres a cuatro veces al día para la forma oral y de 10 mg. dos a tres veces diarios para la forma inyectable.

**CONDICIONES DE CONSERVACION:**

Conservar en lugar fresco y seco fuera del alcance de los niños.

**PRESENTACIONES:**

Envases con 20 y 1000 comprimidos, siendo este último para uso hospitalario exclusivo.

Envases con 6 y 100 ampollas, siendo este último para uso hospitalario exclusivo.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación.  
Certificado N° 42.029

Director Técnico: Leonardo Iannello  
Farmacéutico

"ESTE MEDICAMENTO DEBE SER USADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MÉDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN NUEVA RECETA MÉDICA"

Fecha de última revisión: 04/1996