

# IBUPROFENO KLONAL 400 mg.

## IBUPROFENO

Comprimidos

Venta bajo receta

Industria Argentina

K-34/E

Cada comprimido contiene:

Ibuprofeno .....400 mg.

Excipientes autorizados c.s.

**ACCION TERAPEUTICA:**

Analgésico, antiinflamatorio, antirreumático.

**INDICACIONES:**

Procesos inflamatorios. Dolores agudos (cefaleas, jaquecas, siática, traumatismo, gota, nalgias, adontalgias). Dolores crónicos (artrosis, lumbalgias).

**POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION:**

Dosis usual en adultos: Antireumático (antiinflamatorio no esteroide): 1,2 a 3,2 gr. al día divididos en 3 o 4 dosis. Después de obtener una respuesta satisfactoria la dosis debe ser reducida a la mínima necesaria para el mantenimiento que prevea un continuo control de los síntomas.

Nota: Generalmente se requieren dosis mayores en artritis reumatoidea que en osteoartritis.

Analgésico: (dolor leve o moderado) 200 a 400 mg. cada cuatro o seis horas, según necesidad.

Dosis usual pediátrica: Debe ser establecida por el médico.

**PRECAUCIONES:**

Tomar con un vaso de agua y con el estómago lleno y no acostarse hasta 15-30 minutos después de la toma.

Puede producir somnolencia. Deben evitarse las bebidas alcohólicas.

**Embarazo / Reproducción:** Pese a que no se han hecho estudios adecuados y bien controlados en humanos, los estudios en animales no han mostrado que estos agentes causen efectos adversos sobre el desarrollo fetal.

**Lactancia:** Los estudios en humanos no han detectado ibuprofeno en la leche materna usando métodos capaces de detectar la medicación en una concentración de 1 mg/ml. la dosis de la madre fue de 400 mg. cuatro veces al día.

**Sensibilidad cruzada y/o problemas relacionados:** Los pacientes intolerantes a una droga antiinflamatoria no esteroide, pueden serlo a algunas de los demás.

Puede causar broncoconstricción o anafilaxia en asmáticos sensibles a la aspirina, especialmente a aquellos con la tríada de la aspirina, intolerancia, asma y pólipos nasales.

**Geríatricos:** Los pacientes geriátricos pueden tener mayor tendencia a desarrollar toxicidad gastrointestinal o hepática o renal debido a que la función renal disminuida produce acumulación de la medicación. Algunos médicos recomiendan que los pacientes geriátricos, especialmente aquellos de 70 años o más, reciban inicialmente la mitad de la dosis de adultos.

**Dental:** Puede causar dolor, irritación o ulceración de la mucosa oral.

**Pediátricos:** Pese a que no se han hecho estudios adecuados bien controlados y de largo alcance, no han sido documentados problemas en niños.

De: Impre Quil srl  
Para: Control de Calidad  
Asunto: Muestra para corrección  
Fecha: 14/11/2008

**INTERACCION CON DROGAS:**

Acetaminofeno, adrenocorticoides, glucocorticoides, alcohol, corticotropina, suplementos de potasio aminoglucosidos, glucocidos digitálicos; anticoagulantes derivados de cumarina o derivados de indandiona, heparina o agentes trombolíticos tales como estreptoquinasa y uroquinas, agentes antidiabéticos orales o insulina, antihipertensivos o diuréticos especialmente triamtirene; dos o más analgésicos antiinflamatorios, concurrentes especialmente diflunisal e indometacina o salicilatos especialmente aspirina; otras medicaciones causantes de discrasia sanguínea, depresores de la médula ósea; terapia radioactiva, cefamandol o cefoperezona o cefotetán o mosalactam oplicamicina; colchicina; compuesto de oro, litio, metotrexate; otras medicaciones nefrotóxicas; nifedipina o verapamil; otras medicaciones fotosensibilizantes, otros inhibidores de la agregación plaquetaria, probenecid.

**ACCIONES COLATERALES:**

Picazón en la piel, retención de fluidos, zumbido en los oídos; salpullido, calambres, dolores o molestias leves o moderadas en abdomen o estómago, sensación de hinchazón o gas, acedia o indigestión, náuseas, vómitos, (irritación gastrointestinal), constipación disminución o pérdida de apetito, diarrea, vértigo, somnolencia, dolor de cabeza leve o moderado, nerviosismo o irritabilidad.

**TRATAMIENTO DE EFECTOS ADVERSOS O SOBREDOSIS:**

Vaciado del estómago vía inducción de emesis o lavado gástrico (No se recomienda el jarabe de ipeca). Administración de carbón activado. Monitoreo y soporte de las funciones vitales. Tratamiento sintomático y de soporte. Puede ser útil inducir la diuresis. Pueden ser necesarios aumentadores de volumen de plasma para hipotensión severa; Diazepam para convulsiones; vitamina K para hipoprotrombinemia y/o dopamina más dobutamina para prevenir o revertir las indicaciones anticipadas de fallas renal.

**CONDICIONES DE CONSERVACION:**

Conservar en lugar fresco y seco.

**PRESENTACIONES:**

Envases conteniendo 10, 20, 50 y 1.000 comprimidos, siendo este último para uso hospitalario exclusivo.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación.

Certificado N° 41.042

Director Técnico: Leonardo Iannello  
Farmacéutico

Fecha de última revisión: 02/2000



Planta: Lamadrid 802 - Quilmes - Provincia de Bs. As., Argentina. C.P. (B1878CV)  
Tel. Fax: (54) (11) 4251-5954/5955