



Actividad comprobada sobre los patógenos que provocan infecciones e inflamaciones oculares en pediatría y neonatología



EL AMINOGLUCÓSIDO MÁS UTILIZADO EN OFTALMOLOGÍA

- 💧 Máxima actividad antiinfecciosa ✓
- 💧 Antibiótico de amplio espectro antibacteriano ✓
- 💧 Economía de tratamiento ✓



EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD

Demostrada para su uso en pediatría.

EFECTIVIDAD TERAPÉUTICA

Debido a su capacidad para alcanzar altas concentraciones dentro de las células bacterianas.

Antes de aplicar las gotas oftálmicas, el paciente deberá lavarse muy bien las manos.

Es recomendable tratar ambos ojos, por la posibilidad de contagio entre los mismos.

Posología: se sugiere de 1 a 2 gotas en cada ojo, cada 4 horas.

TEST DE VISIÓN CERCANA PARA LOS MÁS PEQUES

Reconocimiento de figuras



Test de visión cercana



Se debe sostener el cartel para el examen de visión cercana a una distancia aproximada de 36 cm. de los ojos y no más cerca. Se debe leer la tabla utilizando cada ojo por separado y se registra el tamaño de la línea más pequeña que la persona pudo leer con precisión. Si el paciente usa anteojos para leer, debe utilizarlos para el examen.